

CEVAP ANAHTARI - Diyaliz Ünitesi İSG

EĞİTMEN

TARİH

1. Soru

Hepatit B virüsünün (HBV) kurumuş kan lekeleri üzerinde oda sıcaklığında bulaşıcılığını koruma süresi en az kaç gündür?

✓ D) 7 gün

Eğitim içeriğine göre Hepatit B virüsü, kurumuş kan lekeleri üzerinde oda sıcaklığında en az 7 gün süreyle canlı kalarak bulaşıcılığını koruyabilir.

2. Soru

Diyaliz ünitesinde uygulanan 'standart önlemler' ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

✓ B) Hastanın tanısı ne olursa olsun tüm vücut sıvılarını enfekte kabul ederek korunmayı esas alır

Standart önlemler, hastanın tanısına bakılmaksızın tüm vücut sıvılarını enfekte kabul ederek her hastaya karşı güvenlik önlemi alınmasını temel alır.

3. Soru

Kan veya vücut sıvısının göze sıçraması durumunda, bölgenin en az kaç dakika yıkanması gerekmektedir?

✓ B) 15 dakika

Eğitim içeriğine göre, mukoza teması durumunda bölge en az 15 dakika boyunca bol su veya izotonik sodyum klorür solüsyonu ile yıkanmalıdır.

4. Soru

Eldiven kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

✓ D) Eldiven kullanımı el hijyenini tamamlayıcı bir bariyerdir ve hijyen yerine geçmez

Eldiven kullanımı el hijyeni uygulamasının yerini tutmaz; eldivenler, el hijyenini tamamlayıcı bir bariyer olarak kabul edilmelidir ve eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.

5. Soru

Kullanılmış bir iğnenin kapağını geri takmaya çalışmak (recapping) neden yasaktır?

✓ A) İğne batması vakalarının en sık görülen nedenlerinden biri olduğu için

Kullanılmış iğnenin kapağını geri takmaya çalışmak, iğne batması yaralanmalarının en sık görülen nedenidir ve 6331 sayılı Kanun kapsamında risklerin kaynağında önlenmesi prensibine aykırıdır.

6. Soru

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, delici-kesici atık kutuları hangi doluluk oranına ulaştığında kapatılmalıdır?

✓ A) En fazla dörtte üç (3/4) oranında dolduğunda

Güvenlik nedeniyle tıbbi atık torbaları ve kesici-delici alet kutuları, en fazla dörtte üç oranında doldurulmalıdır.

7. Soru

Diyaliz makinesi dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallardan (perasetik asit, hipoklorit) çalışanı korumak için temel önlem nedir?

✓ C) İşlemi kapalı sistemde/yeterli havalandırmada yürütmek ve uygun KKD (eldiven, gözlük) kullanmak

Diyaliz dezenfektanları (perasetik asit, hipoklorit) solunum ve mukoza tahrişi yapar; çalışan işlemi kapalı sistem/yeterli havalandırmada ve uygun KKD ile yürütmeli, farklı kimyasalları karıştırmamalıdır.

8. Soru

Ağır konsantre solüsyon bidonlarının taşınması sırasında bel ve kas yaralanmalarını önlemek için ne yapılmalıdır?

✓ A) Dizleri bükerek ve yükü vücuda yakın tutarak kaldırmak

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uyarınca, ağır yüklerin taşınmasında dizleri bükerek ve yükü vücuda yakın tutarak doğru kaldırma teknikleri uygulanmalıdır.

9. Soru

Bir çalışan diyaliz ünitesinde kan maruziyeti yaşadığında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında atması gereken ilk adım nedir?

✓ C) Olayı tutanak altına alıp işyeri hekimine derhal bildirmek

Maruziyet sonrası olay tutanak altına alınmalı ve işyeri hekimine derhal bildirilmelidir; bu 6331 sayılı Kanun kapsamında yasal bir zorunluluktur.

10. Soru

Diyaliz ünitesinde biyolojik bir dökülme meydana geldiğinde izlenmesi gereken doğru prosedür nedir?

✓ B) Alan derhal izole edilmeli, uygun KKD kullanılmalı ve dökülme kiti ile müdahale edilmelidir

Çapraz bulaşma riskini minimize etmek için alan derhal izole edilmeli, personel ve hastaların girişi engellenmeli ve uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) ile müdahale edilmelidir.