

# SON TEST - Diyaliz Ünitesi İSG

| AD | SOYAD | GÖREVİ | TARİH | İMZA |
|----|-------|--------|-------|------|
|    |       |        |       |      |

## 1. Soru

Hepatit B virüsünün (HBV) kurumuş kan lekeleri üzerinde oda sıcaklığında bulaşıcılığını koruma süresi en az kaç gündür?

- ☐ A) 1 gün ☐ B) 3 gün  
☐ C) 14 gün ☐ D) 7 gün

## 2. Soru

Diyaliz ünitesinde uygulanan 'standart önlemler' ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- ☐ A) Sadece tanısı konulmuş enfeksiyonlu hastalar için koruma sağlar  
☐ B) Hastanın tanısı ne olursa olsun tüm vücut sıvılarını enfekte kabul ederek korunmayı esas alır  
☐ C) Sadece kan yoluyla bulaşan hastalıklar için eldiven kullanımını zorunlu kılar  
☐ D) Yalnızca gözle görülür kanama olan durumlarda ek koruma önlemlerini kapsar

## 3. Soru

Kan veya vücut sıvısının göze sıçraması durumunda, bölgenin en az kaç dakika yıkanması gerekmektedir?

- ☐ A) 5 dakika ☐ B) 15 dakika  
☐ C) 10 dakika ☐ D) 30 dakika

## 4. Soru

Eldiven kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- ☐ A) Eldiven kullanımı el hijyeninin yerini tutan bir yöntemdir  
☐ B) Eldivenler takılıken el hijyeni uygulamasına gerek yoktur  
☐ C) Eldivenler sadece steril işlemler sırasında el hijyeni yerine geçer  
☐ D) Eldiven kullanımı el hijyenini tamamlayıcı bir bariyerdir ve hijyen yerine geçmez

## 5. Soru

Kullanılmış bir iğnenin kapağını geri takmaya çalışmak (recapping) neden yasaktır?

- ☐ A) İğne batması vakalarının en sık görülen nedenlerinden biri olduğu için  
☐ B) İğne kapağının sterilizasyonunu bozduğu için  
☐ C) Sadece iğnenin ucunun körelmesine neden olduğu için  
☐ D) İğnenin damar erişim yoluna zarar verme riski olduğu için

## 6. Soru

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, delici-kesici atık kutuları hangi doluluk oranına ulaştığında kapatılmalıdır?

- ☐ A) En fazla dörtte üç (3/4) oranında dolduğunda  
☐ B) Tamamen dolduğunda  
☐ C) Yarisına kadar dolduğunda  
☐ D) Dörtte bir (1/4) oranında dolduğunda

## 7. Soru

Diyaliz makinesi dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallardan (perasetik asit, hipoklorit) çalışanı korumak için temel önlem nedir?

- ☐ A) Kimyasalı açık kapta, havalandırmaz ortamda uygulamak  
☐ B) Eldiven kullanmadan hızlıca uygulamak  
☐ C) İşlemi kapalı sistemde/yeterli havalandırmada yürütmek ve uygun KKD (eldiven, gözlük) kullanmak  
☐ D) Farklı dezenfektanları karıştırarak etkiyi artırmak

## 8. Soru

Ağır konsantre solüsyon bidonlarının taşınması sırasında bel ve kas yaralanmalarını önlemek için ne yapılmalıdır?

- ☐ A) Dizleri bükerek ve yükü vücuda yakın tutarak kaldırmak  
☐ B) Yükü vücuttan olabildiğince uzakta tutmak  
☐ C) Sadece omuz kaslarını kullanarak kaldırmak  
☐ D) Yükü hızlıca ve tek seferde kaldırmak

## 9. Soru

Bir çalışan diyaliz ünitesinde kan maruziyeti yaşadığında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında atması gereken ilk adım nedir?

- ☐ A) Kendi kendine yaranın iyileşmesini beklemek  
☐ B) Sadece birim sorumlusuna bilgi verip çalışmaya devam etmek  
☐ C) Olayı tutanak altına alıp işyeri hekimine derhal bildirmek  
☐ D) Kendi kan değerlerini bir hafta sonra ölçtürmek

## 10. Soru

Diyaliz ünitesinde biyolojik bir dökülme meydana geldiğinde izlenmesi gereken doğru prosedür nedir?

- ☐ A) Dökülen yerin kuruması beklenmeli ve daha sonra süpürülmelidir  
☐ B) Alan derhal izole edilmeli, uygun KKD kullanılmalı ve dökülme kiti ile müdahale edilmelidir  
☐ C) Temizlik personeli gelene kadar alanın etrafı kapatılmadan beklenmelidir  
☐ D) Sadece su ile yıkanarak döküntü giderilmeli ve herhangi bir KKD kullanılmasına gerek yoktur